

ラタチモ[®] 配合点眼液 「ニットー」

をお使いになる方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬であり、眼圧を下げる効果があります。
容器の半分程度の量が入っていますが、治療に必要な十分な量が入っています。



- 1** 点眼前には手をきれいに洗ってください。



- 2** 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意して1滴だけ点眼してください。



- 3** 点眼後は目を閉じて、1分～5分間目頭を軽く押さえてください。

※目頭を押さえることで薬液が鼻などに流れ込むのを抑えることができます。



点眼後に何か異常を感じたときは、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

点眼時の注意

点眼後の注意点

点眼後、目からあふれた薬液が皮膚についたままにすると、目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

これらを軽減するために…

- 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュなどでふき取るか、目を閉じて洗い流してください。



点眼のタイミング

日常生活では次のタイミングで点眼することをおすすめします。

洗顔前に



入浴前に



保存上の注意

開封前(使い始める前)

- 専用の遮光袋に入れて、冷蔵庫(2℃～8℃)で保存してください。

開封後(使い始めてから)

- キャップはしっかりと閉めてください。
- 専用の遮光袋に入れて、室温(1℃～30℃)でも保存できます。(冷蔵庫での保存も可能です。)
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。



車内や窓際など高温になる場所には放置しないでください。

ラタチモ[®]配合点眼液「ニットー」をお使いになる方へ

●この目薬は、1回1滴、1日1回点眼します。1回1滴を超えて使用しないでください。

※点眼時間については医師にご相談ください。

●他の目薬も使用している場合には、5分以上間隔をあけてから点眼してください。

●点眼により、以下のような症状が出る可能性があります。このような場合、すぐに医師にご相談ください。

- ・目のまわりが黒ずむ
- ・まつ毛が長く、太くなる
- ・瞳の色が濃くなる
- ・充血、目の痛み、目の異物感
- ・涙が出る
- ・息切れ、息苦しさ
- ・脈がとぶ、脈が減る
- ・目のまわりのアレルギー
(腫れや赤み、かゆみなど)

●その他、点眼後に何か異常を感じた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。