

ドルモロール[®] 配合点眼液「ニットー」 を使用されている方へ



この目薬は、2つの薬の主成分
(炭酸脱水酵素阻害薬とベータ遮断薬)が
配合された緑内障・高眼圧症の治療薬で、
眼圧を下げる作用があります。

1

点眼前には手をきれいに
洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、目やまぶた、
まつ毛にふれないように注意して
1滴だけ点眼してください。
※点眼したときにしみることがあります。



3

点眼後は目を閉じて、1～5分間
目頭を軽く押さえてください。
※目頭を押さえることで
薬液が鼻などに流れ込むのを
おさえることができます。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

ドルモロール配合点眼液「ニットー」 を使用されている方へ

点眼時の注意

- この目薬は、1回1滴、1日2回点眼します。
※点眼時間については主治医にご相談ください。
- 他の目薬も使用している場合には、5分以上間隔をあけてから点眼してください。

保存上の注意

- 付属の遮光袋に入れて室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 点眼により、以下のような症状が出る可能性があります。
このような場合、すぐに医師にご相談ください。

- ・充血、目の痛み、目の異物感
- ・息切れ、息苦しさ



- ・脈がとぶ、脈が減る



- ・目のまわりのアレルギー
(腫れや赤み、かゆみなど)



- その他、点眼後に何か異常を感じた場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

発売元
製造
販売元

日東メディック株式会社
東亜薬品株式会社

見やすいユニバーサルカラーと
ユニバーサルフォントを採用し
ています。
®登録商標
2019年7月作成 (K)

UD
FONT

MUD
P10358