

# レスキュラ<sup>®</sup>

点眼液0.12%を  
使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬  
であり、眼圧を下げる作用があります。



1

点眼前には手をきれいに  
洗ってください。



2

点眼時に容器の先が、目やまぶた、  
まつ毛にふれないように注意して  
1滴だけ点眼してください。

※点眼したときにしみることがあります。



3

点眼後は目を閉じて、1～5分間  
目頭を軽く押さえてください。

※目頭を押さえることで薬液が鼻などに流れ  
込むのをおさえることができます。



点眼後に何か異常を感じた場合は、  
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

# レスキュラ<sup>®</sup>点眼液0.12%を使用されている方へ

## 点眼時の注意

- この目薬は、1回1滴、1日2回点眼します。1回1滴を超えて使用しないでください。  
※主治医に指示された用法・点眼方法に従ってください。
- 他の目薬も使用している場合には、5分以上間隔をあけてから点眼してください。

## 保存上の注意

- 付属の遮光袋に入れて室温(1~30℃)で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

## その他

- 点眼により、しみる・痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。