

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 を使用されている方へ

この目薬は、結膜炎や麦粒腫（ものもらい）などの眼感染症治療、また、眼科手術前後の感染予防に用いられます。



- 1** 点眼前には手をきれいに洗ってください。



- 2** 点眼時に容器の先が、目やまぶた、まつ毛に触れないように注意してください。



- 3** 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやガーゼでふき取ってください。



点眼後に何か異常を感じた場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 を使用されている方へ

点眼時の注意

- 医師に指示された用法・点眼方法に必ず従ってください。
- 他の目薬も使用している場合は、5分以上間隔をあけて点眼してください。

保存上の注意

- 付属の投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 医師が指示した使用期間を守り、残りの目薬を使わないでください。

その他の注意

- 息苦しい、全身の皮膚が赤くなる、発疹、血圧の低下などの症状があらわれた場合は、使用を中止し、すぐに医師の診療を受けてください。
- 点眼後、しみる、苦いなどの自覚症状が続く場合は、医師の診療を受けるようにしてください。

発売元

日東メディック株式会社

製造
販売元

東亜薬品株式会社