

# ラタプロスト点眼液 0.005%「ニットー」

をお使いになる方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬であり、眼圧を下げる効果があります。容器の半分の量が入っていますが、治療に必要な十分な量が入っています。

## 点眼後の注意点

点眼後、目からあふれた薬液が皮膚についたまま放置しつづけると、少しずつ目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太くなることがあります。

これらを軽減するために

- ① 目からあふれた薬液は、すみやかに濡れた清潔なティッシュやタオルでふき取ってください。
- ② 目を閉じて、あふれた薬液を洗い流してください。




## 点眼のタイミング

日常生活では次のタイミングで点眼することをおすすめします。

洗顔前に



入浴前に



点眼後に何か異常を感じたときは、  
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

## ラタノプロスト点眼液 0.005%「ニットー」をお使いになる方へ

### 点眼時の注意

- この目薬は、1回1滴、1日1回点眼します。1日1回を超えて使用しないでください。
- 他の目薬も使用している場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。

### 保存上の注意

- 開封後は光を避けて、しゃ光袋に入れて室温（1℃～30℃）で保存してください。
- 開封後4週間経過した場合は、残りの目薬を使わないでください。

### その他の注意

- 点眼後、目が赤くなることがありますが、そのような症状が続く場合は医師にご相談ください。  
※多くの場合、点眼を継続すると症状は軽減しますので、ご自身の判断で点眼を中止しないでください。
- 点眼により、しみる・かゆい・痛いなどの自覚症状が続く場合には、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には、症状が回復するまで機械類の操作や自動車等の運転はしないようにしてください。
- この目薬を使用した場合、人によっては瞳の色が濃くなる場合があります。
- その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。